

## **Erratablad till avhandling:**

Att vara fysiskt aktiv under adjuvant cytostatikabehandling– interventionsstudier för personer med bröst- och kolorektalcancer. ISBN 978-91-7676-520-3

Malin Backman 2017

Sidan 38. Siffrorna längst ut i höger kolumn i Tabell 9 syns nu helt.

**Tabell 9.** Symtom vid baslinje och efter 16 veckor samt genomsnittlig skillnad mellan grupperna efter avslutad intervention (16 veckor).

Utfallsmått MSAS	Baslinje Medel (SD)	Efter 16 veckor Medel (SD);p	Genomsnittlig skillnad mellan grupperna efter 16 veckor		
			KOMB vs KT Medel (95 % CI);p; ES	KOND vs KT Medel (95 % CI);p; ES	KOMB vs KOND Medel (95 % CI);p; ES
<b>Total symtombörda</b>			-0,1 (-0,2 -0,003); <b>.04</b> ; -0,43	-0,12 (-0,23 -0,01); <b>.01</b> ; -0,41	0,18 (-0,08 0,1);1; -0,06
KOMB	0,57 (0,3)	0,51 (0,3);.11			
KOND	0,51 (0,3)	0,46 (0,3);.33			
KT	0,46 (0,3)	0,55 (0,3); <b>.012</b>			
<b>Fysiska symptom</b>			-0,1 (-0,2 0,006);.07; -0,55	-0,06 (-0,1 0,05);.60; -0,38	-0,04 (-0,1 0,06);.9; 0,22
KOMB	0,49 (0,3)	0,47 (0,2);.58			
KOND	0,47 (0,2)	0,51 (0,2);.34			
KT	0,37 (0,3)	0,52 (0,3); <b>.000</b>			
<b>Psykiska symptom</b>			-0,07 (-0,2 0,05);.51; -0,23	-0,09 (-0,2 0,03);.22; -0,2	0,02 (-0,09 0,1);1; -0,05
KOMB	0,60 (0,3)	0,63 (0,3);.36			
KOND	0,53 (0,3)	0,56 (0,3);.46			
KT	0,49 (0,3)	0,63 (0,3); <b>.001</b>			
<b>Total symptomgrad</b>			-0,1 (-0,1 -0,01); <b>.020</b> ; -0,52	-0,07 (-0,1 0,01);.16; -0,35	-0,02 (-0,1 0,05);1; 0,23
KOMB	0,50 (0,2)	0,51 (0,2);.63			
KOND	0,47 (0,2)	0,52 (0,2);.07			
KT	0,42 (0,2)	0,56 (0,2); <b>.000</b>			

MSAS: Memorial Symptom Assessment Scale; KOMB: kombinerad styrke- och konditionsträning; KOND: enbart konditionsträning; KT: kontroll; SD: standardavvikelse; CI: konfidensintervall. Total symtombörda mäter hur bekymrande och besvärande symtomet upplevs.